



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ

ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

VYTVOŘIL/TELEFON: Ing. Libuše Konopíková /545 110 489

E-MAIL: libuse.konopikova@ukzuz.cz

DATUM: 23. ledna 2017

Roundup Klasik Pro – rozsah povoleného použití přípravku

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
brambor, sója, kukuřice a jiné plodiny	plevele jednoleté	20-30 ml 2 l vody /100 m ²	AT	1) před setím, před výsadbou	
brambor, sója, kukuřice a jiné plodiny	plevele vytrvalé	30-50 ml 2 l vody /100 m ²	AT	1) před setím, před výsadbou	
nezemědělská půda	nežádoucí vegetace	30-60 ml 2 l vody /100 m ²	AT		
orná půda po sklizni	plevele jednoleté	20-30 ml 2 l vody /100 m ²	AT		
orná půda po sklizni	plevele vytrvalé	30-50 ml 2 l vody /100 m ²	AT		
réva	plevele jednoleté, turanka kanadská	20 ml 2 l vody /100 m ²	14		
réva	pýr plazivý, pcháč, mléč	30-50 ml 2 l vody /100 m ²	14		
réva	svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá	75 ml 2 l vody /100 m ²	14		
jádroviny, peckoviny mimo broskvoň	pýr plazivý, pcháč, mléč	30-50 ml 2 l vody /100 m ²	AT		

sady ovocné, aleje, jiné porosty dřevin	likvidace pařezů, potlačení pařezové výmladnosti	5 %	AT		
trávníky	obnova porostu	30-60 ml 2 l vody /100 m ²	AT		

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní nebo jde o použití, které stanovení ochranné lhůty nevyžaduje.

Plodina, oblast použití	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
sady ovocné, aleje, jiné porosty dřevin	nátěr, postřik	1x	
brambor, sója, kukuřice a jiné plodiny	postřik	1x	
jádroviny, peckoviny mimo broskvoň	postřik		opakovat podle potřeby max. do celkové dávky 100 ml přípravku/100 m ²
nezemědělská půda	postřik		opakovat podle potřeby max. do celkové dávky 100 ml přípravku/100 m ²
orná půda	postřik	1x	
réva	postřik		opakovat podle potřeby max. do celkové dávky 100 ml přípravku/100 m ²
trávníky	postřik		opakovat podle potřeby max. do celkové dávky 100 ml přípravku/100 m ²

Přípravek aplikujte na listy a ostatní zelené části nežádoucích plevelů. Ošetřované rostliny mají být v plném růstu. Víceleté hluboko kořenící plevele nesmí být zakryty jinými plevely.

Před setím nebo výsadbou plodin

Přípravek lze použít k likvidaci vzešlých plevelů před setím nebo sázením plodin. Následné úpravy ošetřené plochy (kypření, okopávání, příprava pro setí atd.) nebo výsadbu provádějte až poté, co se objeví příznaky působení přípravku na plevelech, minimálně však 10 dní po ošetření. Tím umožníte důkladné proniknutí přípravku až do kořenů plevelů a jejich úplnou likvidaci.

Nezemědělská půda

Přípravek lze použít k odstranění nežádoucí vegetace na hřištích, chodnicích, parkovištích, hřbitovech, skladovacích plochách, dvorech apod. Aplikaci lze opakovat, maximálně však do celkové dávky 100 ml přípravku na 100 m².

Orná půda po sklizni kulturních plodin

Ošetření se provádí po sklizni na vzešlé plevele. Proti pýru plazivému se ošetřuje v době, kdy pýr dosáhne výšky 15 – 25 cm, tj. má vyvinuté nejméně 3 – 4 listy. Následnou kultivaci ošetřené plochy (okopávání, orba, rytí atd.) provádějte až poté, co se plně projeví příznaky působení přípravku na plevelech.

Vinice, jádroviny peckoviny (kromě broskvoní)

Proti svlačci rolnímu, pampelišce lékařské a kopřivě dvoudomé se vzhledem k jejich odolnosti doporučuje ošetřovat dávkou 75 ml/100 m² po nasazení poupat, popřípadě aplikaci po několika týdnech zopakovat. U ostatních plevelů se aplikace řídí výškou plevelů během celého vegetačního období. Ošetřované rostliny mají být v plném růstu a nejméně 20 cm vysoké. Víceleté hluboko zakořeňující plevele nesmí být zakryty jinými plevely. Ošetření, při kterých hrozí zasažení kmínků postřikem, se doporučuje provádět nejdříve 3. rokem po výsadbě.

Aplikaci lze opakovat, maximálně však do celkové dávky 100 ml přípravku na 100 m².

Dřeviny v sadech, alejích a jiných porostech

Nátěr či postřik pařezů je nutno provést do 8 – 9 hodin po řezu. U větších pařezů postačí nátěr nebo postřik okrajů pařezu. Nejvhodnější termín aplikace je léto a podzim.

Trávníky – obnova porostů

Při likvidaci starého trávníku použijte dávku odpovídající nejodolnějšímu druhu přítomného plevele. Při větším výskytu vytrvalých plevelů, zejména pampelišky lékařské, se vzhledem k jejich odolnosti doporučuje ošetřovat dávkou 60 ml/100 m², případně aplikaci po několika týdnech opakovat, maximálně však do celkové dávky 100 ml přípravku na 100 m².

Nevstupujte do ošetřených porostů před tím, než postřik zcela zaschne, zabráníte tak přenosu přípravku na jiné rostliny.

Vždy zamezte zasažení zelených částí kulturních rostlin, ať už přímým postřikem nebo úletem postřikové mlhy!

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Okamžitě po použití důkladně odstraňte veškeré zbytky přípravku z aplikačního zařízení.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.